Université Claude Bernard Lyon 1

ADN

Association pour
le Développement
de la Neurogénétique

كلية العلوم
السملاية - مراكش
FACULTÉ DES SCIENCES
SEMLALIA - MARRAKECH

THESE DE DOCTORAT
Spécialité: Biologie, Médecine et Santé

La maladie de Wilson au Maroc: données épidémiologiques, cliniques et génétiques et approches nutritionnelles

Nadia ABBASSI

Sous la Direction de

Pr. Azeddine SEDKI

Pr. Alain LACHAUX

Muriel BOST PharmD PhD

Plan

- 01** **Introduction**
- 02** **Chapitre I**
Prévalence, profil épidémiologique, clinique, diagnostic, thérapeutique et pronostic de la maladie de Wilson au Maroc
- 03** **Chapitre II**
Etude génétique moléculaire
- 04** **Chapitre III**
Diététique
- 05** **Conclusion générale et recommandations**

Introduction

1 sur 30 000 à 100 000 naissances

Age de manifestation: 5 - 40 ans

Figure: Gène *ATP7B*

Chang et al., 2017

Plus de 900 mutations
Origine ethnique

Métabolisme du cuivre

A. Métabolisme normal

B. Métabolisme dans la maladie de Wilson

Poujois et *al.*, 2021

Signes cliniques de la MW

EuroWilson

Diagnostic de la MW

Arguments cliniques

Bilan biologique

Bilan hépatique

Bilan cuprique

Cuprurie des 24h
Augmentée

Céruloplasminémie
Cuprémie **Diminuée**

Cuivre échangeable **Augmentée**
REC (ratio du cuivre échangeable/ cuivre sérique total)

Examen ophtalmologique :lampe à fente

IRM cérébrale

Etude génétique

Traitement de la MW

D-Pénicillamine
Trientine

Sujet atteint de la maladie de Wilson traité par un chélateur

EuroWilson

Sujet atteint de la maladie de Wilson traité par les sels de zinc

Problématiques

- ✓ Prévalence de la MW est inconnue au Maghreb.
- ✓ Aucune étude n'a été faite à l'échelle nationale sur la MW.
- ✓ Le spectre des mutations est mal connu.
- ✓ Pas de table alimentaire pour les patients atteints de la MW.

Objectifs généraux de l'étude

Chapitre I: Prévalence, profil épidémiologique clinique, diagnostic, thérapeutique et pronostic de la maladie de Wilson au Maroc

01

Estimer la prévalence de la MW

02

Déterminer les données épidémiologiques, cliniques et thérapeutiques

03

Spécifier les données diagnostiques et les difficultés de la prise en charge

04

Préciser le taux de mortalité et les causes de décès

- Type de l'étude: rétrospective descriptive
- Période d'étude: 13 ans (2008-2020)
- Nombre de cas total: 226 cas
- Lieu de l'étude: cinq CHU du Maroc

Les données sont collectées à partir des registres et des dossiers médicaux des patients

Fiche d'exploitation

I- Identité:

- Numéro: .....
- Sexe: .....
- Age: .....
- Année d'hospitalisation: .....
- Origine: .....

II- Antécédents:

- Personnels: .....
- Familiaux: .....
- Consanguinité: Oui Non
- Degré de consanguinité: .....
- Cas similaire dans la fratrie: Oui Non

III- Données cliniques

- Motif de consultation : .....
- Forme (hépatique et /ou neurologique): .....
- Signes hépatiques: .....
- Signes neurologiques: .....
- Signes ophtalmologiques :
  - o Anneau de Kayser- Fleischer
  - o Cataracte en fleur de Tournesol
- Autres signes: .....

IV- Données para-cliniques

- Bilan Biologique :

- NFS :
  - o Anémie hémolytique
  - o Thrombopénie
  - o Leucopénie
  - o Autres : .....

•BILAN D'HEMOSTASE :

- TP:
  - o TP < 50%
  - o 50% < TP < 70%
  - o TP > 70%
- INR: .....

•BILAN HEPATIQUE :

- ASAT :
  - o Normal
  - o Modérément élevé (2-4*N)
  - o Très élevé (>4*N)
- ALAT :
  - o Normal
  - o Modérément élevé (2-4*N)
  - o Très élevé (>4*N)
- GGT :
  - o Normal
  - o Modérément élevé (2-4*N)
  - o Très élevé (>4*N)
- PAL :
  - o Normal
  - o Elevé

ALBUMINE :

- o Normal
- o Elevé

BILIRUBINE :

- o Normal
- o Elevé

- Bilan cuprique :

- CUPREMIE:
  - o Normal (14 – 21 µmol/L)
  - o Effondré (<10 µmol/L)
- CUPRURIE :
  - o Normal (<40 µg/24h)
  - o Elevé (>100 µg/24h)
- CERULOPLASMINE :
  - o Normal (0.2 – 0.4 g/L)
  - o Effondré (<0.2 g/L)

- Radiologie :

- Echographie abdominale :
  - o Foie de taille normale
  - o Foie atrophique
  - o HPM
  - o SPM
  - o Foie cirrhotique
  - o Signes d'HTP
  - o Autres : .....
- IRM cérébrale :
  - o Normale
  - o Anomalies du signal
  - o Autres : .....

V- Traitement

Régime pauvre en cuivre:

- Oui Non
- D- pénicillamine: Oui Non
- Acétate de zinc: Oui Non
- Sulfate de zinc: Oui Non

- Changement du traitement: Oui Non

•Cause de changement du traitement:

.....

- Arrêt du traitement: Oui Non

•Indication de transplantation hépatique:

Oui Non

Faite Non faite

VI- Evolution

- Evolution: Favorable Décès

•Cause de décès: .....

•Age de décès:

.....

VII- Enquête familiale: .....

Tous les patients diagnostiqués ou suivis pour la MW au sein des cinq CHU du Maroc

Le score de Leipzig ≥ 4

Critères d'inclusion

Les dossiers complets

Les dossiers exploitables

Formes cliniques

Forme asymptomatique

L'absence des symptômes hépatiques et neurologiques mais les résultats de laboratoire sont compatibles avec la MW.

Forme hépatique

Symptômes hépatiques (ictère, hépatomégalie, cirrhose ...) sans symptômes neurologiques.

Forme neurologique

Symptômes neuropsychiatriques tels que tremblements, dystonie, dysarthrie, trouble de la personnalité.. avec ou sans signe de maladie hépatique.

Analyse statistique et interprétation des données

Pr. Alain Lachaux
Dr. Eduardo Couchonnal
Mr. Abdelouahed BELMALIH

Considérations éthiques

L'avis favorable des
médecins traitants

L'avis favorable
des chefs de
services

L'avis favorable des comités
d'éthique Hospitalo-Universitaire de
Marrakech (n°032/2020) et de Fès
(n°15/20)

I. Prévalence

Prévalence annuelle moyenne: 3.88: 100 000

I.1. Prévalence selon les années

Année	Population			Nombre de cas de MW			Prévalence pour 10 ⁵		
	F	M	T	F	M	T	F	M	T
2008	197 389	175 748	373 137	2	3	5	1.01	1.71	1.34
2009	202 611	189 669	392 280	3	4	7	1.48	2.11	1.78
2010	207 491	206 806	414 297	4	7	11	1.93	3.38	2.66
2011	212 452	226 024	438 476	6	5	11	2.82	2.21	2.51
2012	217 139	242 899	460 038	7	4	11	3.22	1.65	2.39
2013	220 657	253 150	473 807	11	4	15	4.99	1.58	3.17
2014	222 586	254 067	476 653	9	10	19	4.04	3.94	3.99
2015	223 170	248 080	471 250	12	11	23	5.38	4.43	4.88
2016	223 222	239 444	462 666	14	8	22	6.27	3.34	4.76
2017	222 873	232 110	454 983	9	14	23	4.04	6.03	5.06
2018	221 383	226 449	447 832	10	14	24	4.52	6.18	5.36
2019	218 656	224 021	442 677	10	16	26	4.57	7.14	5.87
2020	214 968	223 824	438 792	8	21	29	3.72	9.38	6.61

6.61

Comparaison des résultats avec d'autres études

Pays	Prévalence	Pourcentage de consanguinité	Référence
Maroc	3.88	22.79 % [Talbi <i>et al.</i> , 2007]	Notre série, 2020
Chine	1.8	1.8 %	Cheung N <i>et al.</i> , 2014
France	1.5	0.8 %	Poujois A <i>et al.</i> , 2018

I.2. Prévalence selon les régions

Consanguinité
[Talbi et *al.*, 2007]

I.3. Répartition des cas selon les CHU

CHU	Service	Nombre de cas	Nombre total de cas	Nombre total de décès
Mohammed VI Marrakech	Pédiatrie	52	57	25
	Neurologie	5		
Ibn Rochd Casablanca	Pédiatrie	36	42	11
	Hépto-Gastro-entérologie	5		
	Neurologie	1		
Ibn Sina Rabat	Pédiatrie	31	39	13
	Hépto-Gastro-entérologie	1		
	Neurologie	7		
Hassan II Fès	Pédiatrie	45	60	13
	Hépto-Gastro-entérologie	2		
	Neurologie	13		
Mohammed V Oujda	Pédiatrie	24	28	10
	Hépto-Gastro-entérologie	3		
	Neurologie	1		
Total			226	72

II. Données épidémiologiques

II.1. Age

Age moyen de diagnostic: 13 ans (5-42 ans).

II.2. Sexe

Sex-ratio = 1.15

- ✓ Une observation similaire a également été faite par d'autres chercheurs (*Zhong et al., 2019; Rukunuzzaman et al., 2015; Lin et al., 2014*).
- ✓ *Cheung et al., 2017 et De Andrade Sócio et al., 2010*: prédominance féminine.
- ✓ *Lau et al., 1990*: les hommes et les femmes sont également affectés par la MW.

II.3. Antécédents

▪ **Consanguinité**

- **Consanguinité**
- **Absence de consanguinité**

N= 143

- 1er degré : 94 cas
- 2ème degré: 34 cas
- 3ème degré: 15 cas

✓ Résultats confirmés par l'étude de Gungor *et al.*, 2018.

▪ **Le décès dans la fratrie** par la MW était noté dans 17% des cas.

- ✓ Ce pourcentage était moins élevé dans d'autres études: 15 % au Bangladesh et (Rukunuzzaman *et al.*, 2015) 7.5 % en Chine (Lin *et al.*, 2014).

III. Données cliniques

III.1. Délai d'évolution

(durée entre les premiers signes et diagnostic)

Délai moyen : 2.8 ans (6 mois-8 ans).

- ✓ Ce délai était plus long par rapport à ce qui a été rapporté dans la littérature.

III.2. Forme clinique

- ✓ Résultats similaires à l'étude de El-Karakasy *et al*, 2011.
- ✓ Une prévalence plus faible de la forme hépatique (21.1%) et plus élevée de la forme neurologique (78.9%) a été signalée par Taly *et al.*, 2007 en Inde.

IV. Diagnostic

IV.1. Bilan cuprique

	Diminué	Normal	Augmenté
Céruleplasmine N= 187	167 (89%)	20 (11%)	-
Cuprémie N= 159	126 (79%)	33 (21%)	-
Cuprurie des 24h N= 209	-	10 (5%)	199 (95%)

- ✓ Les mêmes résultats sont trouvés par *Beinhardt et al, 2014*.
- ✓ La céruléplasmine est normale chez 11% des cas, ce qui été rapportés par d'autres chercheurs : *Gungor et al: 10.9%* et *Rukunuzzaman et al: 36%*.

IV.2. Examen ophtalmologique

N= 193 cas

- Présence AKF
- Absence AKF

AKF-Forme neurologique:
65 patients (79%)

AKF-Forme hépatique:
66 patients (60%)

IV.3. Examen radiologique

Echographie abdominale

- N= 226

IRM Cérébrale

- N= 85
- Anormale chez 53 cas (N: 53 et H: 6)

- ✓ Dans l'étude de Rukunuzzaman et *al.*, l'hépatite fulminante a été détectée chez 3 patients.

V. Traitement

Traitement initial

2% 2% 4%

92%

Durée: 6 mois

Mauvaise
observance +
indisponibilité du
traitement

N= 71 cas

Traitement suivant

21%

12%

4%

63%

- D-Pénicillamine
- Acétate de zinc
- Sulfate de zinc
- Pas de traitement

✓ Dans la littérature, la D-Pénicillamine est le traitement le plus utilisé pour la MW [El-Karakasy et al. 2011, Hassan et al. 2004 et Arnon et al. 2007].

Effets secondaires du traitement

D-Pénicillamine

Thrombopénie (32)

Hypersensibilité sévère (13)

Aggravation neurologique (11)

Vomissements sévères (6)

Troubles de la conscience (4)

Acétate de zinc

Vomissements, nausées et
perte d'appétit (2)

Sulfate de zinc

Irritation gastrique(3)

- ✓ Nos résultats confirment les données de la littérature [El-Karakasy et al. 2011, Hassan et al. 2004 et Arnon et al. 2007].

VI. Sévérité de la MW selon le score de Child-Pugh

	1 point	2 points	3 points
Ascite	Absente	Modérée	Tendue ou réfractrice aux diurétiques
Bilirubine (µmol/L)	<35	35-50	>50
Albumine (g/L)	>35	28-35	<28
INR	<1.7	1.7-2.2	>2.2
TP	>50%	40-50%	<40%
Encéphalopathie	Absente	Légère à modérée (stade 1-2)	Sévère (stade 3-4)

N= 162 cas

Classe A: 5-6 points

Classe B: 7-9 points

Classe C: 10-15 points

VII. Evolution

- ✓ 2 fois plus élevé que celui rapporté en Égypte (15%) [El-Karakasy et *al.*, 2011] et 15 fois plus élevé qu'en France (2%) [Couchonnal et *al.*, 2021].
- ✓ Les patients décèdent à jeune âge par rapport à la littérature

La majorité des cas sont des enfants et des jeunes adultes

La MW pose un problème aussi bien diagnostique que thérapeutique

Prévalence élevée de la MW au Maroc

La plupart des patients ont une atteinte sévère

Taux de mortalité élevé et les patients décèdent à jeune âge

Chapitre II: Etude génétique moléculaire

Déterminer le spectre de mutations des patients diagnostiqués Wilson dans le CHU de Marrakech

Etudier la relation phénotype-génotype.

Critères d'inclusion

Les patients qui sont encore suivis dans l'un des services de gastro-hépatologie ou neurologie pédiatriques ou adultes du CHU de Marrakech

Les patients qui ont des dossiers complets

Les patients qui sont consentants pour participer à cette étude.

Labo de génétique-
CHU
Marrakech

Labo
IntegraGen

CBE
Dr. Muriel BOST
Dr. Cécile PAGAN

Step 01

Receuil des échantillons
Convocation des patients
N= 18

Step 02

Extraction d'ADN
Extraction saline
Miller et al.

Step 03

Séquençage
NGS
Illumina
NovaSeq

Step 04

Analyse bio-informatique
Pipeline bio-informatique (IntegraGen)

Goal

8 mutations:

- ✓ 4 mutations non-sens
- ✓ 3 mutations faux-sens
- ✓ Un épissage

2 nouvelles mutations
Etat homozygote

I. Mutations non-sens

I.1. p.Gln1277Hisfs*52

- ✓ Nouvelle mutation ;
- ✓ Délétion-insertion dans l'exon 18 au niveau du domaine ATP hinge ;
- ✓ WDM 11 et WDM 18

I.2. p.Gln289*

- ✓ Mutation dans l'exon 2 ;
- ✓ Substitution de la cytosine en thymine codant le domaine Cu3 ;
- ✓ WDM 2 et son frère et WDM 8

I.3. p.Glu583Argfs*25

- ✓ Mutation dans l'exon 5 ;
- ✓ Duplication de l'adénine codant le domaine Cu6 ;
- ✓ WDM 5 et sa sœur et WDM 13

Famille 5

Famille 13

I.4. p.Cys305*

- ✓ Mutation dans l'exon 2 ;
- ✓ Substitution de la thymine en adénine codant le domaine Cu3 ;
- ✓ WDM 15

Famille 15

II. Mutations faux-sens

II.1. p.Cys1104Arg

- ✓ Nouvelle mutation;
- ✓ Transversion au niveau de l'exon 15
- ✓ Changement de la cystéine à l'arginine codant le domaine ATP loop ;
- ✓ WDM 14

Famille 14

II.2. p.Lys1020Arg

- Mutation au niveau de l'exon 13;
- Transversion de la lysine à l'arginine codant le domaine Ph/ATP loop ;
- WDM 1 et WDM 10

Famille 1

Famille 10

II.3. p.Thr1232Pro

- ✓ Mutation au niveau de l'exon 17;
- ✓ Transversion de la thréonine à la proline codant le domaine ATP bind ;
- ✓ WDM 9, WDM 16 et WDM 17

Famille 9

Famille 16

Famille 17

III. Epissage

c.51+4A>T

- ✓ Mutation au niveau de l'intron 1 ;
- ✓ Substitution de l'adénine en thymine situé avant le domaine Cu1 ;
- ✓ WDM 3 et sa sœur

Famille 3

L'analyse génétique n'a montré aucune mutation au niveau du gène *ATP7B* chez 4 patients

Cas	Forme clinique	Bilan cuprique			AKF	Sous traitement	Etude génétique
		Cp g/L	Cuprémie $\mu\text{mol/L}$	Cuprurie $\mu\text{mol/24h}$			
WDM 4	N	-	-	7.9	Présent	Régression des signes cliniques	Pas de variant pathogène
WDM 6	N	0.03	-	9.2	Présent	Bonne amélioration	Pas de variant pathogène
WDM 7	H	0.2	12.2	2.7	Présent	Bonne amélioration	Pas de variant pathogène
WDM 12	H	-	-	7.9	Présent	Régression des signes cliniques	Pas de variant pathogène

La mutation est peut être présente sur la région promoteur ou dans une région intronique profonde ou sinon un diagnostic différentiel

Analyse des CNVs et des quatre gènes (*CP*, *SLC33A1*, *NPC1* et *NPC2*)

Faire un bilan cuprique complet (CuEx et REC) + Etude génétique du génome

Comparaison des mutations avec autres études

Variant	Exon/Intron	Nbre de familles	Pays	Référence
p.Thr1232Pro	Ex 17	3	France Brésil	Couchonnal et al. 2021 Deguti et al. 2004
p.Lys1020Arg	Ex 13	2	France	Couchonnal et al. 2021
p.Cys305*	Ex 2	1	Italie	Loudianos et al. 1998
c.51+4A>T	In 1	1	France Italie	Couchonnal et al. 2021 Lovicu et al. 2009
p.Glu583Argfs*25	Ex 5	2	Royaume-Uni	Fernando et al. 2021

Aucune des mutations identifiées dans notre étude n'était partagée avec celles des pays arabes (Algérie, Tunisie, Arabie saoudite, Égypte, Iran, Oman et Liban).

Etude de la relation génotype-phénotype

Variant (nombre de cas)	Patient	Signes cliniques (H = hépatique) (N= neurologique)	AKF	Age d'apparition des signes	Littérature
p.Thr1232Pro (3 cas) Ex 17 / ATP bind	WDM 9 WDM 16 WDM 17	H H N	Absent Absent Présent	9 ans 9 ans 15 ans	Deguti et <i>al.</i> : 2 patients qui ont présenté des signes neurologiques à l'âge de 14 et 15 ans. Couchonnal et <i>al.</i> : un patient qui a présenté des signes neurologiques à l'âge de 15 ans.
p.Gln289* (3 cas) Ex 2 / Cu3	WDM 2 Frère WDM 8	N + H N H	Absent Présent Absent	14 ans 18 ans 6 ans	Zrhidri et <i>al.</i> : un patient qui a présenté des signes hépatiques à l'âge de 8 ans.
p.Glu583Argfs*25 (3 cas) Ex 5 / Cu6	WDM 5 Frère WDM 13	N + H (sévère) H H (sévère)	Présent Présent Présent	12 ans 10 ans 16 ans	Fernando et <i>al.</i> : un patient qui a présenté une cirrhose (sévère) et l'AKF à l'âge de 7 ans.
p.Gln1277Hisfs*52 (2 cas) Ex18 / ATP hinge	WDM 11 WDM 18	H H	Présent Absent	10 ans 13 ans	

✓ Le NGS a montré huit mutations dont deux nouvelles.

✓ L'analyse génétique n'a montré aucune mutation chez 4 patients.

Chapitre III: Diététique

Définir la teneur en
Cu des aliments les
plus fréquemment
consommés au
Maroc.

Etablir une table
alimentaire pour
les patients
atteints de la
MW.

Zone de l'étude

La région Marrakech- Safi

Echantillons analysés

Laboratoire des éléments traces - CBAPS

Validation de la technique de dosage du Cu par ICP-OES

	Répétabilité	Fidélité intermédiaire	LD	LQ
Moyenne ($\mu\text{g/L}$)	38.06	155.72	0.04	0.04
Ecart type	0.75	6.31	0.08	0.08
CV (%)	2	4.05		
LD / LQ ($\mu\text{g/L}$)			0.27	0.83

Validation: CV < 10%

Les teneurs en Cu de l'eau et des aliments marocains

1- Eau potable

Echantillon	Concentration en Cu ($\mu\text{g/L}$)
Barrage Moulay Youssef	< 0.27
Barrage Sidi Driss	< 0.27
Puit N'Fis	0.37
Puit Ourika	< 0.27
Puit Aguedal	< 0.27
Puit Menara	< 0.27
Puit Saada	< 0.27
Eau de robinet domicile n°1 (1 ^{ère} ouverture)	< 0.27
Eau de robinet domicile n°2 (après 30s d'ouverture)	< 0.27

2- Légumes frais et légumes secs

[Cu] (mg/100g)

Comparaison des teneurs en Cu (mg/100g) dans les légumes avec d'autres études

Echantillon	Notre étude	Afssa France	USDA Food Data Central Etats-Unis	McCance and Widdowson's Royaume-Uni
Soja	4.54	0.83	1.10	1.55
Pois chiche	2.25	0.61	0.40	0.95
Courgette	1.97	0.05	0.10	0.02
Lentilles	1.87	0.53	0.40	1.02
Fève	1.43	-	0.30	0.32
Céleri	1.33	0.03	1.40	0.01

3- Fruits frais et fruits secs

[Cu] (mg/100g)

Comparaison des teneurs en Cu (mg/100g) dans les fruits avec d'autres études

Echantillon	Notre étude	Afssa France	USDA Food Data Central Etats-Unis	McCance and Widdowson's Royaume-Uni
Graines de tournesol	2.58	1.80	1.80	2.27
Noix de cajou	2.52	2.20	2.20	2.04
Amande	1.56	1.00	1.10	1.00
Noix	1.45	1.60	1.60	1.34
Pistache	1.04	1.30	1.30	0.83

4- Céréales

[Cu] (mg/100g)

Comparaison des teneurs en Cu (mg/100g) dans les céréales avec d'autres études

Echantillon	Notre étude	Afssa France	USDA Food Data Central Etats-Unis	McCance and Widdowson's Royaume-Uni
Semoule	8.40	0.19	-	-
Graines de lin	1.68	-	1.20	-
Graines de sésame	1.35	2.50	2.50	1.46

5- Epices

[Cu] (mg/100g)

Comparaison des teneurs en Cu (mg/100g) dans les épices avec d'autres études

Echantillon	Notre étude	Afssa France	USDA Food Data Central Etats-Unis	McCance and Widdowson's Royaume-Uni
Cardamome	3.96	0.38	0.40	-
Safran	3.64	0.33	0.30	-
Safran ordinaire	2.91	-	-	-
Maniguette	2.49	-	-	-
Fenugrec	1.95	-	1.10	-

6- Plantes aromatiques

[Cu] (mg/100g)

Comparaison des teneurs en Cu (mg/100g) dans les plantes aromatiques avec d'autres études

Echantillon	Notre étude	Afssa France	USDA Food Data Central Etats-Unis	McCance and Widdowson's Royaume-Uni
Laurier	5.13	0.42	0.40	-
Anis	2.00	0.91	0.90	-
Thym	0.98	0.86	0.60	0.86
Menthe simple	0.86	1.50	1.50	-

La semoule, le soja, le safran et la cardamome sont des aliments très riches en cuivre

Il est nécessaire de compléter cette table alimentaire avec d'autres aliments: viandes (abats), fruits de mer, chocolat...

Il est important d'établir une table alimentaire propre pour chaque pays ou région.

Prévalence élevée
(consanguinité) +
Taux de mortalité
élevé (diagnostic,
traitement)

Le spectre de
mutations identifié
dans notre étude
devra être
compléter pour
aider le conseil
génétique

Il est nécessaire
d'établir un régime
alimentaire adapté
à chaque
population

Conclusion Générale

Forces et limites de l'étude

Forces

- ✓ Notre étude est la première étude au Maghreb qui estime la prévalence.
- ✓ La première étude qui fait une observation à l'échelle nationale et qui traite toutes les caractéristiques de la MW (épidémiologie, clinique, diagnostic traitement, mortalité, génétique et nutrition).

Limites

- ✓ La prévalence calculée est approximative.
- ✓ Le nombre des patients inclus dans l'étude génétique est faible.
- ✓ Nous n'avons pas étudié tous les groupes alimentaires comme les viandes (abats), les produits de la mer, chocolat ...

Recommandations

Aux autorités sanitaires et politiques

La nécessité de la mise sur le marché marocain de la D-Pénicillamine et de la Trientine.

Rendre plus disponible le bilan cuprique au niveau des hôpitaux publics.

La mise en place d'analyses génétiques dans les hôpitaux publics.

Former des équipes spécialisées dans les transplantations d'organe (foie...)

Au personnel socio-sanitaire

Penser à la MW devant toute hépatopathie chronique chez un enfant de plus de 5 ans.

Penser à la MW devant tout trouble neurologique non spécifique : troubles de la marche et de L'écriture, tremblements...

La nécessité d'établir des tables complètes de conseils alimentaires.

L'élaboration de guides thérapeutiques ou de brochures informatives pour les patients.

Aux populations

Consulter dans les structures sanitaires devant toute symptomatologie traînante (ictère, tremblement, troubles de la marche ou de la parole ...).

La nécessité de faire un dépistage familial en cas de diagnostic de la MW chez un membre de la famille.

La nécessité de suivre un régime alimentaire pauvre en cuivre.

Ne pas arrêter le traitement sans prendre l'avis du médecin traitant.

Valorisation scientifique

Articles

2 articles publiés +
Un article sous révision

Communications

6 communications

1^{er} prix poster

Formations

11 formations
théoriques et pratiques

Activités

Créations d'une antenne des médecins traitants de la MW et organisation des RCP Franco-marocaines pour discuter les dossiers des patients marocains

Création d'une association des patients atteints de la MW

Organisation des réunions entre patients et avec des médecins traitants
Traduction en arabe de guide thérapeutique PNDS et des brochures de CRMR

Contacteur des laboratoires pour le traitement

Remerciements